

Astrid-Mette Husøy og Ann Cathrine Kroksveen (red)

Blodprøvetaking i praksis

4. UTGAVE

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

Fasit til flervalgsoppgaver

Kapittel 8

Spesiell prøvetaking

- 1. Hva er riktig prosedyre dersom det er mistanke om kateterrelatert sepsis?**
 - c. Ta blodprøve både fra kateteret og en perifer vene
- 2. Hva er årsaken til at sterile injeksjonstørk (70 % alkohol) ikke er tilstrekkelig ved desinfeksjon av punksjonsstedet ved blodkultur?**
 - b. De dreper ikke normale hudbakterier effektivt nok
- 3. Hvorfor fylles den aerobe flasken før den anaerobe flasken ved blodkultur, når en bruker veneprøvetakingssett til prøvetaking?**
 - d. Fordi det er luft i slangen som skal inn i den aerobe flasken
- 4. Hvor bør blodprøven tas hvis pasienten får intravenøs terapi gjennom et perifert venekateter (PVK) i arm?**
 - a. I samme arm, etter at infusjon er stoppet i 10 minutter
 - b. I motsatt arm, eventuelt i fot
- 5. Hvor lenge anbefales det at infusjonen med total parenteral ernæring (TPN) stanses før rutinemessig blodprøvetaking, ifølge norske retningslinjer?**
 - d. 15 minutter
- 6. Hvorfor er det viktig å avbryte den intravenøse infusjonen før blodprøvetaking i samme arm som det pågår infusjon?**
 - d. For å sikre at blodprøven ikke blir tilblandet eller fortynnet
- 7. Hva er en potensiell risiko ved blodprøvetaking fra et venekateter eller arteriekateter?**
 - b. Økt risiko for infeksjon og kateterokklusjon
- 8. Hva er den generelle anbefalingen for hvor mye blod som skal kastes, før blodprøvetaking fra et sentralt venekater (SVK)?**
 - a. To ganger dødvolumet
- 9. Hva bør gjøres før prøvetaking fra SVK for å unngå kontaminasjon og fortynning av blodprøven?**
 - a. Skyll kateteret med saltvann og fjern «kasteblood»
- 10. Hva kan redusere risikoen for hemolyse ved prøvetaking fra et kateter?**
 - a. Bruke det største lumenet i et flerlumenkateter

11. Hva er den viktigste grunnen til at blodgassprøver bør analyseres raskt etter prøvetaking?

b. Det hindrer metabolismen i blodcellene

12. Hvorfor er det viktig å vende/blande blodgassprøyten umiddelbart etter prøvetaking?

c. For å hindre at det dannes koagler

13. En pasient får intravenøs behandling med **Gentamicin når du kommer for å ta en blodprøve på morgenrunden. Det er bestilt Gentamicin-speil (0.-prøve). Hva er riktig å gjøre?**

a. Undersøk med sykepleier på avdelingen om prøven skal tas eller utsettes