

Astrid-Mette Husøy og Ann Cathrine Kroksveen (red)

Blodprøvetaking i praksis

4. UTGAVE

CAPPELEN DAMM AKADEMISK

Flervalgsoppgaver

Kapittel 5

Infeksjonsforebygging og smittevern

1. **Hva er en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI)?**
 - a. En infeksjon som alltid skyldes dårlig immunforsvar
 - b. En infeksjon som oppstår som følge av opphold eller behandling i en helseinstitusjon
 - c. En infeksjon som kun kan behandles med antibiotika
 - d. En infeksjon som skyldes dårlig kosthold
2. **Hvilket av følgende tiltak anses som det viktigste for å hindre spredning av smitte?**
 - a. Bruk av arbeidstøy
 - b. Hostehygiene
 - c. Håndhygiene
 - d. Bruk av beskyttelsesbriller
3. **Hva er formålet med basale smittevernrutiner?**
 - a. Å beskytte helsepersonell mot smitte
 - b. Å forebygge smitte mellom pasienter og beskytte helsepersonell
 - c. Å hindre unødvendig bruk av hansker og munnbind
 - d. Å redusere kostnadene i helsetjenesten
4. **Når skal håndvask benyttes i stedet for hånddesinfeksjon?**
 - a. Når hendene er synlig rene
 - b. Når alkoholbasert desinfeksjon ikke er tilgjengelig
 - c. Før rene arbeidsoppgaver
 - d. Ved kontakt med sporedannende bakterier eller synlig forurensning
5. **Hvilket utsagn om hanskebruk er riktig?**
 - a. Hansker er helt tette og gir full beskyttelse mot blodsmitte
 - b. Hansker erstatter behovet for håndhygiene
 - c. Hansker skal brukes til konkrete arbeidsoppgaver, men de erstatter ikke håndhygiene
 - d. Hansker skal kun brukes ved kontakt med intakt hud
6. **Når anbefales det å bruke klorheksidinsprit som huddesinfeksjon?**
 - a. Ved prøvetaking til blodkultur
 - b. Ved vanlig blodprøvetaking
 - c. Ved prøvetaking av premature nyfødte
 - d. Ved huddesinfeksjon hos pasienter med lateksallergi
7. **Hva er formålet med isolering av pasienter?**
 - a. Å beskytte helsepersonell mot smitte
 - b. Å hindre spredning av infeksjoner gjennom blokkering av smitteveier
 - c. Å erstatte behovet for basale smittevernrutiner

d. Å skille pasienter med ulike sykdommer i forskjellige rom

8. **Hvilket virus har høyest risiko for smitteoverføring ved stikkskader med kontaminert kanyle?**

- a. Hepatitt B
- b. Hepatitt C
- c. HIV
- d. Cytomegalovirus

9. **Hva skal gjøres umiddelbart etter en stikkskade med spontan blødning?**

- a. Klemme på stikkstedet for å stoppe blødningen
- b. La såret blø før en vasker stikkstedet med såpe og vann i 10 minutter
- c. Desinfisere med 70 % alkohol
- d. Fylle ut en skademelding før førstehjelp